



Information

der Chirurgischen Klinik

St. Marienkrankenhaus · Salzburger Straße 15 · 67067 Ludwigshafen am Rhein · www.st-marienkrankenhaus.de

Leistenbruch-/ Bauchwandbruch-/ Nabelbruchoperation

Kommt es im Bereich der Bauchwand zu Schwachstellen, entstehen Lücken, durch die sich Bauchinhalt herausdrücken kann. Typische Stellen an denen solche Lücken entstehen, sind die Leiste, der Nabel und Narben nach vorangegangenen Operationen im Bauchraum.

Einzig sinnvolle Behandlung eines solchen Eingeweidebruchs ist der operative Verschluss der entstandenen Lücke. Gewöhnlich kann man diese Operation sorgfältig planen. In manchen Fällen kommt es aber zu Einklemmungen des Bruches mit starken Schmerzen, was eine sofortige Operation nötig macht.

Der operative Verschluss der Bruchlücke kann über verschiedene Methoden durchgeführt werden.

Klassische Operation mittels Bauchschnitt

Über einen Einschnitt an der Bauchdecke wird der Bruchsack abgetragen und die Bruchlücke entweder direkt vernäht oder ein Kunststoffnetz zur Verstärkung der Bauchdecke eingenäht.

Operation mittels Bauchspiegelung

Heute operieren Chirurgen zunehmend mit der sogenannten Schlüsselloch-Chirurgie. Über einen kleinen Einschnitt in der Bauchdecke werden stabförmige Instrumente und eine Kamera eingesetzt und die Bruchlücke angezeigt. Um den Einblick zu verbessern, wird das Operationsgebiet mit CO₂-Gas aufgebläht. Die Bruchlücke wird dann mit einem Kunststoffnetz verschlossen.

Alle Verfahren werden bei uns in der Klinik eingesetzt. Darüber, welches Verfahren für Sie persönlich das Beste ist und welche Form der Narkose dabei möglich ist, beraten wir Sie gerne im persönlichen Gespräch.